RETRASO EN EL LENGUAJE

El retraso en el habla de los bebÃ©s y niÃ±os debe ser diagnosticado lo antes posible

Seminario 2 - 23/02/2010

Â

EL DIAGNÃ“STICO:CUANTO ANTES MEJOR

Sin embargo, antes de prescribir un diagnostico de trastorno especÃ-fico del lenguaje, es imprescindible descartar, mediante un diagnÃ³stico diferencial, una serie de criterios como:

- No existencia de deficiencia auditiva.
- No presencia de trastorno neurolÃ³gico.
- Un Coeficiente Intelectual (CI) superior a 80.
- La no existencia de otras Ã¡reas del desarrollo afectadas como la memoria, ritmo, motricidad,...

Cuando el retraso del niÃ±o aparece SOLO EN EL HABLA nos encontramos con algunas caracterÃ-sticas que pueden ser observadas en esos casos:

- AlteraciÃ³n en el orden de las sÃ-labas (cocholate por chocolate).
- AsimilaciÃ³n de consonantes (fufanda por bufanda).
- Ausencia de grupos consonÃ¡nticos (teno por tengo).
- Sustituciones (pistina por piscina).

DISFASIA

Pero si ademÃ¡s del habla, el niÃ±o tambiÃ©n presenta afecciones en el lenguaje, tendrÃ¡ dificultades en el uso de pronombres, artÃ-culos, tiempos verbales,... siendo su lenguaje muy difÃ-cil de entender. En ese caso estamos hablando de una disfasia.

Los niÃ±os que presentan retraso en el lenguaje, ya sea leve o severo, han de ser diagnosticados por un especialista lo antes posible, ya que una intervenciÃ³n temprana evitarÃ¡ el aparecimiento de posibles secuelas que podemos traducir por difluencias en el habla (tartamudez), logo fobias (miedo a hablar), dislexias (dificultades en lecto-escritura), etc.

El retraso del lenguaje es una de las afecciones mÃ¡s frecuentes en una consulta de Logopedia y FoniatrÃ-a.

Noticia subida por: M.Angeles MontalbÃ¡n Manzano